

# OPERACE VARIXŮ DOLNÍCH KONČETIN

Chirurgická léčba varixů dolní končetiny je jednoznačně považována za nejúčinnější způsob terapie primárních varixů.

Principem operace je šetrné odstranění nebo pouze ligace (uzavření) nefunkčních žil, se snahou dosáhnout co nejlepšího kosmetického efektu a ústupu subjektivních obtíží.

Součástí operace je přerušení spojek mezi hlubokými a povrchovými žilami.

K operaci přistupujeme buď ranou v třísele a nad vnitřním kotníkem, nebo z malých řezů přímo v místě postižené cévy.

Jednou z používaných metod na našem pracovišti je metoda podle A. Rameleta, kdy drobným háčkem z miniotvorů v kůži změněnou žilu zachytíme a odstraníme. Kůži uzavíráme plastickými stehy.

Nezbytnou součástí před vlastní operací je sonografie (ultrazvuk), který zmapuje celý žilní systém a odhalí případné nefunkční žíly.



Po operaci je provedena bandáž dolní končetiny, po odeznění anestézie se může končetina normálně zatěžovat. Operace provádíme v rámci jednodenní chirurgie – tzn. druhý den po výkonu odchází pacient do domácího ošetřování. Další péče je uskutečňována ambulantními návštěvami. Cílem léčby je krátká doba rekonvalescence a rychlý návrat k aktivitám.



Sklerotizace drobných varixů (metliček) se řeší ambulantně. Speciální látka se tenkou jehličkou vpravuje přímo do žíly. Žilka je uvnitř chemicky zničena.

Podrobné informace vám podají lékaři chirurgické a flebologické ambulance Vysokomýtské nemocnice (tel.: 465 467 245)

